


Q1 Merci de renseigner vos coordonnées avant de commencer.

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Votre nom et prénom	100.00%	40
Votre établissement	0.00%	0
Adresse	0.00%	0
Adresse 2	0.00%	0
Ville/Localité	0.00%	0
Région	0.00%	0
Code postal	0.00%	0
Pays	0.00%	0
Adresse email	100.00%	40
Numéro de téléphone	100.00%	40

Q2 Votre type d'établissement

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Centre hospitalier (1)	50.00%	20
Ehpad (2)	10.00%	4
SSR (3)	10.00%	4
EPSM (4)	7.50%	3
CHU (5)	7.50%	3
Clinique (6)	15.00%	6
TOTAL		40


STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 6.00	Médiane 1.50	Moyenne 2.58	Écart-type 1.91

Q3 Votre établissement :

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0

08 - CH Charleville										
08 - CH de Sedan										
08 - CH Nouzonville										
08 - EPSM Bélaïr										
08 - CRF Charleville...										
08 - Polyclinique...										
08 - GHSA										
08 - CH Vouziers										
55 - CH Verdun										
02 - Résidence Val d'Oise										
02 - Résidence Paul Claudel										
02 - Résidence Les millésimes										
02 - Résidence Les Fables										
02 - Ch Chateau Thierry										
02 - Ch Villiers Sai...										
51 - CHU Reims										
51 - Centre godinot										
51 - CH Epernay										
51 - Clinique										

Les alimentations à l'hôpital



Les alimentations à l'hôpital

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les alimentations à l'hôpital

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
08 - CH Charleville (1)	0.00%	0
08 - CH de Sedan (2)	0.00%	0
08 - CH Nouzonville (3)	0.00%	0
08 - EPSM Bélair (4)	0.00%	0
08 - CRF Charleville Mézières (5)	0.00%	0
08 - Polyclinique du parc (6)	0.00%	0
08 - GHSA (7)	0.00%	0
08 - CH Vouziers (8)	0.00%	0
55 - CH Verdun (9)	0.00%	0
02 - Résidence Val d'Oise (10)	0.00%	0
02 - Résidence Paul Claudel (11)	0.00%	0
02 - Résidence Les millésimes (12)	0.00%	0
02 - Résidence Les Fables (13)	0.00%	0
02 - Ch Chateau Thierry (14)	0.00%	0
02 - Ch Villiers Saint Denis (15)	0.00%	0
51 - CHU Reims (16)	0.00%	0
51 - Centre godinot (17)	0.00%	0
51 - CH Epernay (18)	0.00%	0
51 - Clinique Sainthe Marthe Epernay (19)	0.00%	0
51 - Clinique Epernay Kapasanté (20)	0.00%	0
51 - CH Chalons en champagne (21)	0.00%	0
51 - EPSM Chalons (22)	0.00%	0
51 - CH Vitry le François (23)	0.00%	0
51 - Résidence Pierre d'Arcis (24)	0.00%	0
51 - GHAM Sézanne (25)	0.00%	0
51 - GHAM Romilly (26)	0.00%	0
51 - CH Brienne le Chateau (27)	0.00%	0
51 - CRF Saint Parres aux Tertres (28)	0.00%	0
51 - CH Troyes (29)	0.00%	0
51 - CRF Pasteur à Troyes (30)	0.00%	0
51 - EHPAD Saint Vincent à Troyes (31)	0.00%	0
51 - CH Bar sur Aube (32)	0.00%	0

Les alimentations à l'hôpital


51 - CH Bar sur Seine (33)	0.00%	0
52 - CHHM Saint Dizier (34)	0.00%	0
52 - CH Wassy (35)	0.00%	0
52 - CH Joinville (36)	0.00%	0
52 - CH Chaumont (37)	0.00%	0
52 - CH Bourbonne (38)	0.00%	0
Autre (veuillez préciser) (39)	100.00%	40
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE

Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
39.00	39.00	39.00	39.00	0.00

Q4 Votre établissement possède-t-il un CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition)?

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	95.00%	38
Non (2)	2.50%	1
Ne sais pas (3)	2.50%	1
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	3.00	1.00	1.08	0.35

Q5 Votre établissement dispose-t-il d'un UTNC (Unité Transversale de Nutrition Clinique) ou équivalent?

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	27.50%	11
Non (2)	72.50%	29
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	2.00	1.73	0.45


Q6 Quels sont vos effectifs ? à renseigner en ETP (équivalent temps plein)

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
En temps de diététicien consacré aux prises en charges cliniques (exclure le temps de restauration et d'encadrement)	100.00%	40
En temps de médecin nutritionniste	100.00%	40

Q7 Proposer un choix entre plusieurs plats.(ceci est différent de 'répondre aux aversions du patient')

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	37.50%	15
Non (2)	47.50%	19
Partiellement (3)	15.00%	6
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	3.00	2.00	1.78	0.69

Q8 Répondre aux recommandations pour la prévention et la promotion de la santé (GEMRCN , PNNS et/ ou ANSES)

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	65.00%	26
Non (2)	20.00%	8
Ne sais pas (3)	15.00%	6
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	3.00	1.00	1.50	0.74

Q9 Connaitre les valeurs nutritionnelles des repas, notamment pour les prescripteurs et les diététiciens

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	20.00%	8
Non (2)	80.00%	32
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	2.00	1.80	0.40

Q10 Apporter un minimum de 2000 kcal par jour, en dehors de toute alimentation personnalisée.

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, pour toutes les textures (1)	0.00%	0
Oui, uniquement pour les alimentations standard (2)	37.50%	15
Non (3)	42.50%	17
Ne sais pas (4)	20.00%	8
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 2.00	Maximum 4.00	Médiane 3.00	Moyenne 2.83	Écart-type 0.74

Q11 Répondre à la prévention et prise en charge de la dénutrition en proposant une alimentation enrichie en protéines et calories

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	70.00%	28
Non (2)	30.00%	12
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	1.00	1.30	0.46

Q12 Fractionner la prise alimentaire en proposant plus de 3 repas par jour.

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, en théorie et en pratique (1)	47.50%	19
Oui en théorie, mais pas en pratique (2)	42.50%	17
Non (3)	10.00%	4
Ne sais pas (4)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 3.00	Médiane 2.00	Moyenne 1.63	Écart-type 0.66

Q13 Toute alimentation (y compris le 'normal') fait l'objet d'une prescription médicale à l'admission du patient, adaptée à la situation clinique

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	7.50%	3
Non (2)	40.00%	16
Pas toujours (3)	52.50%	21
Ne sais pas (4)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 3.00	Médiane 3.00	Moyenne 2.45	Écart-type 0.63

Q14 Les alimentations thérapeutiques sont réévaluées en cours d'hospitalisation et lors de la sortie par un médecin et / ou un diététicien

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	30.00%	12
Non (2)	10.00%	4
Ne sais pas (3)	0.00%	0
Pas toujours (4)	60.00%	24
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 4.00	Médiane 4.00	Moyenne 2.90	Écart-type 1.37

Q15 Une commande de repas cumulant plus de 2 restrictions alimentaires est possible (mouliné + sans sucre + sans sel par exemple)

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	95.00%	38
Non (2)	5.00%	2
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	1.00	1.05	0.22

Q16 Les adaptations de textures reposent sur les recommandations internationales IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation)

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	22.50%	9
Non (2)	70.00%	28
Ne sais pas (3)	7.50%	3
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 3.00	Médiane 2.00	Moyenne 1.85	Écart-type 0.53

Q17 Une commande de repas sans aliments acides ou sans épices est possible

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Non (1)	32.50%	13
Ne sais pas (2)	10.00%	4
Oui, précisez l'indication (3)	57.50%	23
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	3.00	3.00	2.25	0.92

Q18 Dans votre établissement il est possible d'adapter les apports en protéines à tous les stades de maladie rénale et de dénutrition (différents niveaux de restriction et d'enrichissement)

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, partiellement, uniquement restriction (1)	7.50%	3
Oui partiellement uniquement enrichissement (2)	22.50%	9
Oui, totalement, restriction et enrichissement (3)	42.50%	17
Non (4)	27.50%	11
Ne sais pas (5)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	4.00	3.00	2.90	0.89

Q19 L'offre alimentaire propose une alimentation thérapeutique hypolipidique <35% de lipides par jour

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	60.00%	24
Non (2)	27.50%	11
Ne sais pas (3)	12.50%	5
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	3.00	1.00	1.53	0.71

Q20 Si oui, sur quelle(s) indication(s)

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 16




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Hypertriglycémie majeure primitive (1)	54.17%	13
Épanchement chyleux (2)	45.83%	11
Ne sait pas (3)	0.00%	0
Autre (veillez préciser) (4)	83.33%	20
Nombre total de participants: 24		

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 4.00	Médiane 2.00	Moyenne 2.61	Écart-type 1.32

Q21 La prescription d'une alimentation à visée de réduction pondérale est possible, sans attendre un avis spécialisé en nutrition.

Réponses obtenues : 40 Question(s) ignorée(s) : 0




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	60.00%	24
Non (2)	40.00%	16
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		40

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	1.00	1.40	0.49

Q22 Une alimentation standard est proposée au patient diabétique, sans exclusion des desserts dits sucrés

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	8.11%	3
Non (2)	91.89%	34
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	2.00	1.92	0.27

Q23 L'alimentation standard propose un apport régulier en glucides à chaque repas.

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	75.68%	28
Non (2)	24.32%	9
Ne sais pas (3)	0.00%	0
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	1.00	1.24	0.43

Q24 Les quantités de glucides sont connues et accessibles à tout moment pour chaque plat servi, pour le patient comme pour les soignants.

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	0.00%	0
Non (2)	94.59%	35
Ne sais pas (3)	5.41%	2
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
2.00	3.00	2.00	2.05	0.23

Q25 L'alimentation thérapeutique pauvre en sel permet des apports inférieurs à 5 g de NaCl par jour

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	78.38%	29
Non (2)	10.81%	4
Ne sais pas (3)	10.81%	4
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	3.00	1.00	1.32	0.66

Q26 Proposez vous une alimentation sans gluten?

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, pour toute personne en faisant la demande (1)	45.95%	17
Oui, pour les personnes diagnostiquées comme atteintes de maladie coeliaque. (2)	51.35%	19
Non (3)	2.70%	1
Ne sais pas (4)	0.00%	0
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 3.00	Médiane 2.00	Moyenne 1.57	Écart-type 0.55

Q27 En cas d'intolérance au lactose, l'alimentation exclut tous les produits laitiers sans exception

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	43.24%	16
Non (2)	54.05%	20
Ne sais pas (3)	2.70%	1
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum 1.00	Maximum 3.00	Médiane 2.00	Moyenne 1.59	Écart-type 0.54

Q28 L'alimentation thérapeutique appelée "pauvre en fibre strict" ou "sans résidus" ou "sans résidus strict" contient les aliments suivants :

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




Les alimentations à l'hôpital

	OUI (1)	NON (2)	NE SAIS PAS (3)	TOTAL
Jus de fruits sans pulpe	29.73% 11	64.86% 24	5.41% 2	37
Pommes de terre	54.05% 20	45.95% 17	0.00% 0	37
Pain blanc	37.84% 14	62.16% 23	0.00% 0	37
Lait	43.24% 16	54.05% 20	2.70% 1	37
Dérivés du lait	64.86% 24	35.14% 13	0.00% 0	37

STATISTIQUES DE BASE					
	MINIMUM	MAXIMUM	MÉDIANE	MOYENNE	ÉCART-TYPE
Jus de fruits sans pulpe	1.00	3.00	2.00	1.76	0.54
Pommes de terre	1.00	2.00	1.00	1.46	0.50
Pain blanc	1.00	2.00	2.00	1.62	0.48
Lait	1.00	3.00	2.00	1.59	0.54
Dérivés du lait	1.00	2.00	1.00	1.35	0.48

Q29 Dans quelle(s) indication(s) cette restriction en fibre est elle proposée : (plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES		RÉPONSES	
Sténoses intestinales symptomatiques (1)	54.05%	20	
Sténoses intestinales asymptomatiques (2)	18.92%	7	
Explorations digestives à visée diagnostique par imagerie (coloscopie par exemple) (3)	97.30%	36	
A visée diagnostique basée sur la symptomatologie (4)	45.95%	17	
Ne sais pas (5)	0.00%	0	
Autre (veuillez préciser) (6)	54.05%	20	
Nombre total de participants: 37			

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	6.00	3.00	3.30	1.66

Q30 Une alimentation modérément restrictive en fibres (15-20g par jour) peut être proposée à visée symptomatologique (de confort digestif)

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 3



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui (1)	97.30%	36
Non (2)	2.70%	1
Ne sait pas (3)	0.00%	0
TOTAL		37

STATISTIQUES DE BASE				
Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Écart-type
1.00	2.00	1.00	1.03	0.16

Q31 Avez vous des remarques ou des suggestions à formuler?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 28